



Администрация
города Оренбурга



ГБУЗ "Оренбургский областной
клинический противотуберкулезный
диспансер"

ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА

Туберкулез - это опасное инфекционное заболевание, которое, чаще всего, передается от больного человека к здоровому при кашле, разговоре, чихании.

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ:



СЛАБОСТЬ, РАЗБИТОСТЬ,
ПОТЛИВОСТЬ,
ПОВЫШЕННАЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ,
СНИЖЕНИЕ ВНИМАНИЯ,
УХУДШЕНИЕ ПАМЯТИ



ОТСУТСТВИЕ АППЕТИТА,
ПОХУДАНИЕ ЗА КОРОТКИЙ
ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ



ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПОВЫШЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ДО
37,0-37,3 °C



ПОДКАШЛИВАНИЕ

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА

У подростков для выявления начальных признаков туберкулеза легких проводятся флюорографическое обследование и иммунодиагностика.

Всем детям с 12 месяцев до 7 лет для выявления инфицирования микобактериями туберкулеза проводится внутрикожная диагностическая проба Манту, а с 8 до 17 лет используется проба с Диаскинтестом.

Профилактика туберкулеза среди детского населения проводится путем иммунизации вакциной БЦЖ впервые в родильном доме и ревакцинация в возрасте 6-7 лет.

Уважаемые родители! В случае впервые положительных результатов реакции Манту и Диаскинтеста вас могут направить к врачу-фтизиатру, к которому необходимо обратиться, имея на руках сведения о всех предыдущих пробах и данные о прививках БЦЖ.

Помните! Вакцинация БЦЖ - самая эффективная защита Вашего ребенка от туберкулеза, а проба Манту и проба с Диаскинтестом - надежные и безопасные методы раннего выявления заболевания.



Администрация
города Оренбурга



ГБУЗ "Оренбургский областной
клинический противотуберкулезный
диспансер"

ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА

Туберкулез - это опасное инфекционное заболевание, которое, чаще всего, передается от больного человека к здоровому при кашле, разговоре, чихании.

РАЗВИТИЮ ТУБЕРКУЛЕЗА СПОСОБСТВУЮТ:

хронические заболевания (сахарный диабет, язвенная болезнь, ВИЧ-инфекция), неполноценное питание, систематическое переутомление, хронические стрессы, злоупотребление алкоголем, курение, наркомания.

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА:



КАШЕЛЬ С ВЫДЕЛЕНИЕМ
МОКРОТЫ БОЛЕЕ ТРЕХ
НЕДЕЛЬ



СЛАБОСТЬ, РАЗБИТОСТЬ,
ПОТЛИВОСТЬ, ПОВЫШЕННАЯ
УТОМЛЯЕМОСТЬ, СНИЖЕНИЕ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ



ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
ТЕЛА ДО 37.3 °C
В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ



БОЛИ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ



КРОВОХАРКАНЬЕ



ОТСУТСТВИЕ АППЕТИТА,
ПОХУДАНИЕ НА 5-10 И БОЛЕЕ
КГ ЗА КОРОТКИЙ
ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ

Специалисты противотуберкулезного диспансера призывают Вас ежегодно, для своевременного выявления туберкулеза, проходить флюорографическое обследование в поликлиниках по месту жительства.

**ПОДУМАЙТЕ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЬЕ СВОИХ БЛИЗКИХ -
ПРОЙДИТЕ ФЛЮОРОГРАФИЮ!**